

## 膜翅目：泥蜂总科

周勤 吴燕如

(中国科学院动物研究所)

本文记述采自横断山区的泥蜂总科12种,分属于2科8属。

### 泥蜂科 SPHECIDAE

#### (1) 黄柄泥蜂 *Sceliphron madraspatanum* Fabricius, 1787

采集记录: 四川(盐源金河, 1 200m, 1984.VII.1, 4个; 乡城, 2 700m, 1982.VI.27, 2个); 云南(德钦梅里石, 2 200m, 1982.VII.19, 6个)。

分布: 台湾、广东、四川、云南; 印度, 印度尼西亚, 菲律宾。

#### (2) 四脊泥蜂 *Sphex aurallentus* Fabricius, 1787

采集记录: 四川(盐源金河, 1 200m, 1984.VII.1, 5个)。

分布: 福建、台湾、广东、四川; 日本, 印度, 菲律宾。

#### (3) 银毛泥蜂 *Sphex argentatus* Fabricius, 1787

采集记录: 四川(盐源金河, 1 200m, 1984.VII.1, 5个)。

分布: 河北、陕西、山东、浙江、台湾、广东、广西、四川。

#### (4) 黑毛泥蜂 *Sphex subtruncatus* Dahlbom, 1843

采集记录: 四川(盐源金河, 1 200m, 1984.VII.1, 3个)。

分布: 辽宁、浙江、江西、福建、台湾、广东、四川; 日本, 朝鲜, 印度, 泰国, 菲律宾。

#### (5) 皱胸泥蜂 *Ammophila atripes* Smith, 1852

采集记录: 四川(盐源金河, 1 200m, 1984.VII.1, 4个); 云南(中甸冲江河, 1 800m, 1984.VIII.6, 4个; 永胜六德, 2 300m, 1984.VII.8, 3个)。

分布: 东洋区。

#### (6) 日本泥蜂 *Ammophila sabulosa nipponica* Tsuneki, 1967

采集记录: 四川(马尔康, 2 700m, 1983.VIII.17, 5个; 泸定德威, 1983.VI.21, 6个);

云南(中甸冲江河,1800m,1981.VIII.6,1个;永胜六德,2300m,1984.VII.8,11个;丽江玉龙山,2800m,1984.VIII.6,3个;兰坪金顶,2350m,1984.VIII.24,2个)。

分布:台湾、四川、云南;全北区。

(7) 齿爪泥蜂 *Podalonia affinis* Kirby, 1798

采集记录:四川(德格马尼干戈,3900m,1983.VII.8,2个;马尔康,2800m,1983.VIII.20,1个);云南(丽江玉湖,2750m,1984.VII.27,2个)。

分布:四川、云南;全北区。

(8) 多毛泥蜂 *Podalonia hirsuta* Scopoli, 1763

采集记录:云南(丽江玉龙山,2800m,1981.VII.17,2个;永胜六德,2300m,1984.VII.8,1个)。

分布:台湾、云南;蒙古,地中海。

(9) 日本蓝泥蜂 *Chalybion japonicum* Gribodo, 1883

采集记录:四川(荣经泗坪,1100m,1984.VI.25,1个)。

分布:台湾;日本,朝鲜。

(10) 犀角泥蜂 *Hoplammophila aemulans* Kohl, 1901

采集记录:四川(泸定,2400m,1984.VI.19,2个);云南(永胜六德,2300m,1984.VII.8,2个)。

分布:吉林、浙江、江西、台湾、四川、云南;日本,朝鲜。

小唇沙蜂科 LARRIDAE

(11) 四带小唇沙蜂 *Tachytes astutus* Nurse, 1909

采集记录:云南(中甸冲江河,1800m,1984.VIII.6,5个)。

分布:台湾、云南;印度,泰国。

(12) 刻臀小唇沙蜂 *Larra fenchihuensis* Tsuneki, 1967

采集记录:四川(汶川映秀,1600m,1983.VI.18,2个;泸定磨西,1600m,1983.VI.18,2个)。

分布:浙江、台湾、四川。